



Rapsims™

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: E 2.4.1 Směs stopových živin bór (B), mangan (Mn), molybden (Mo), zinek (Zn) s dusíkem (N) a sírou (S) ve formě suspenzního koncentráту.

Obsah živin

| | | |
|---------------|--------|---------|
| Bór (B) | 3,40% | 50 g/l |
| Mangan (Mn) | 6,20% | 90 g/l |
| Molybden (Mo) | 0,27% | 4 g/l |
| Zinek (Zn) | 4,80% | 70 g/l |
| Dusík (N) | 5,6% | 82 g/l |
| Síra (S) | 11,00% | 160 g/l |

Čistá hmotnost: 7,3 kg

Výrobce (dle Nařízení č. 2003/2003): FMC Agro Česká republika spol. s r.o.

Použijte jen v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Unikátní směs bóru, manganu, molybdenu a zinku, doplněná dusíkem a sírou, pro listovou aplikaci v řepce oleje, hořčici bílé, máku setém, kukuřici, luskovinách a brukvovité zelenině.

Inovativní formulace k zabezpečení dokonalé listové pokrývnosti a přilnavosti postřikové kapaliny a optimální dostupnosti a příjmu živin.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotách nad 5°C.

Skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých, chladných a větratelných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním svitem a přímými zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Původ hnojiva:

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

www.fmc-agro.co.uk

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Varování

H315 Dráždí kůži.

H411 Toxický pro vodní organismy,

s dlouhodobými účinky.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+352 PŘI STYKU

S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+313 Při podráždění kůže:

Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one.

Může vyvolat alergickou reakci.

Číslo šarže: uvedeno na obalu


Datum výroby: uvedeno na obalu

Distributor v ČR:

FMC Agro Česká republika spol. s r.o.

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

tel.: 283 871 701



Balení: 10 L



Rapsims™

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

Dávkování: Aplikujte 1 – 3 l/ha v závislosti na stupni deficitu živin. Použijte minimálně 200 l vody/ha, zabezpečte důkladné pokrytí listové plochy.

TERMÍN APLIKACE

Řepka olejka, hořčice bílá

První aplikace se provádí ve fázi 4 - 9 listů a opakuje se dle potřeby v intervalu 10 - 14 dní resp. opět na začátku prodlužovacího růstu a ve fázi butonizace.

Mák setý

První aplikace se provádí od 4. listu máku až do fáze přizemní listové růžice, druhá aplikace se provádí na začátku prodlužovacího růstu resp. nejlépe ve fázi pylových tetrad.

Kukuřice

První aplikace se provádí ve fázi 5 listů a opakuje se dle potřeby.

Luskoviny (hrách, bob, sója)

Aplikace se provádí na začátku vegetace, v době, kdy rostliny mají dostatečně vyvinutou listovou plochu pro příjem živin. V případě potřeby lze ošetření opakovat v intervalu 10 - 14 dní. Poslední aplikace je možná 4 týdny před sklizní.

Brukvovitá zelenina

Aplikace se provádí na začátku vegetace, v době kdy, rostliny mají dostatečně vyvinutou listovou plochu pro příjem živin. V případě potřeby lze ošetření opakovat v intervalu 10 - 14 dní. Poslední aplikace je možná 4 týdny před sklizní.

Upozornění

Neaplikujte v době intenzivního slunečního svitu a při teplotách nad 25°C.

Pokud je to možné, aplikujte v podvečerních anebo v ranních hodinách.

PŘÍPRAVA POSTŘIKU

Před otevřením a použitím důkladně homogenizujte protřepáním. Aplikáční technika musí být čistá. Nádrž postřikovače naplňte do poloviny vodou, zapněte míchání a doplňte potřebné množství přípravku Rapsims. Kanystry od hnojiva důkladně vypláchněte a výplach přidejte do nádrže postřikovače. Nádrž doplňte na požadovaný objem a bez zbytečné prodlevy aplikujte. Míchání nechte po dobu aplikace zapnuté. Po skončení aplikační techniku důkladně vyčistěte.

MÍSITELNOST

Rapsims je fyzikálně a chemicky kompatibilní s širokou řadou agrochemických přípravků. Konkrétní možnosti konzultujte s dodavatelem hnojiva. Vždy pozorně čtěte etiketu všech přípravků před jejich použitím v tank-mixu s hnojivem Rapsims.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotách nad 5°C.

Skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých, chladných a větratelných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním svitem a přímými zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Distributor v ČR:

FMC Agro Česká republika spol. s r. o.
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
tel.: 283 871 701

15140703 Czech
22022019